

impfen-info.de

Impfkalender 2013/2014 - Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2013



Säuglinge und Kleinkinder
(2 – 23 Monate)



Kinder und Jugendliche
(2 – 17 Jahre)



Erwachsene
(ab 18 Jahre)

Impfungen	6 Wochen	2 Monate	U4 3 Monate	4 Monate	U6 11–14 Monate	U7 15–23 Monate	2–4 Jahre	U9 5–6 Jahre	9–11 Jahre	J1 12–17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N		A1	A2		A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie						N		A1	A2		A (alle 10 Jahre)	
Keuchhusten (Pertussis)						N		A1	A2		A**	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)						N						
Kinderlähmung (Poliomyelitis)						N			A		ggf. N	
Hepatitis B						N						
Pneumokokken		G1	G2	G3	G4	N						S***
Rotaviren	G1*	G2	(G3)									
Meningokokken C					G (ab 12 Monaten)		N					
Masern					G1	G2	N				S****	
Mumps					3-fach- Impfung MMR	3-fach- Impfung MMR + Windpocken	N					
Röteln							N					
Windpocken (Varizellen)					G1	G2	N					
Gebärmutterhalskrebs (HPV)										♀ G1–G3		
Grippe (Influenza)												S (jährlich)



Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Kinder



Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1 – G4)



Standardimpfung



Impfempfehlung für Frauen



Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Jugendliche



Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)



Auffrischimpfung

* die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen

** einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ ggf. Poliomyelitis

*** einmalige Impfung ab 60 Jahre, je nach Gesundheitszustand ggf. Auffrischung

**** Nachholimpfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Immunschutz